

PREMIERS GESTES ET ITINERAIRE THERAPEUTIQUE DES ENFANTS VICTIMES DE STENOSE CAUSTIQUE DE L'ŒSOPHAGE A L'HOPITAL DU MALI

Auteurs : Cisse M, Maiga IB, Maiga AA, Ombotimbe A, Bazongo M, Koita MS, Diop S, Ignanga KND, Konaté F, Coulibaly I, Kone AI, Koné SD, Coulibaly S, Togo S, Ouattara MA, Yena S.

I. Introduction

- La sténose caustique de l'œsophage chez l'enfant (scoe) constitue un drame.
- Gravité liée :
 - la malnutrition
 - lésions caustiques associées
 - coût de la prise en charge (1)



1. Yéna S, Togo S, Ouattara MA, Sankaré I, Tu ZL, Maiga IB et al. Les sténoses caustiques de l'oesophage de l'enfant en chirurgie. Quelle stratégie thérapeutique pour un pays en développement ? journal de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. 2014 [cité le 30 nov 2016]. 18(4) : 230-6.

II. Objectif

Déterminer les premiers gestes entrepris après l'ingestion caustique et le parcours thérapeutiques des victimes de scoe dans le service de chirurgie thoracique de l'hôpital du Mali.

III. Méthodologie

- **Type et période d'étude:**
 - Etude longitudinale, descriptive de janvier 2012 à décembre 2018
- **Lieu d'étude:**
 - Service de chirurgie thoracique de l'hôpital du Mali



IV. Résultats (1/7)

Données générales

- Patient au total: 70
- Fréquence hospitalière: 1,52%
- Moyenne/an: 10
- Age moyen: 5,8 ans
- Sex ratio= 1,41

IV. Résultats (2/7)

Tableau I: circonstances de survenue

Circonstances de survenue	Effectifs	Pourcentage
<u>Accidentelle</u>	<u>67</u>	<u>95,7</u>
Volontaire	3	4,3
Total	70	100,0

IV. Résultats (3/7)

Tableau II: délai de Prise en charge

Délai de PEC	Effectifs	Pourcentage
<u>Immédiat</u>	<u>67</u>	<u>95,7</u>
Avant 1 mois	2	2,9
Après 1 mois	1	1,4
Total	70	100,0

IV. Résultats (4/7)

Tableau III: type de soins prodigué

Type de soins	Effectifs	Pourcentage
<u>Moderne</u>	<u>69</u>	<u>98,6</u>
Traditionnel	1	1,4
Total	70	100

IV. Résultats (5/7)

Tableau IV: Premier geste fait

Premier geste	Effectifs	Pourcentage
<u>Boire du lait</u>	<u>46</u>	<u>65,7</u>
Vomir	6	8,6
Boire de l'eau	6	8,6
Boire et vomir	6	8,6
Aucun geste	6	8,6
Total	70	100,0

IV. Résultats (6/7)

Tableau V: conduite à tenir des soignants

CAT des soignants	Effectifs	Pourcentage
<u>Traitement puis référence</u>	<u>65</u>	<u>92,9</u>
Référence immédiate	5	7,1
Total	70	100

IV. Résultats (7/7)

Tableau VI: nombre de structure fréquentée

Nbre strucutre	Effectifs	Pourcentage
<u>Deux</u>	<u>39</u>	<u>55,7</u>
Trois	17	24,3
Sup à trois	8	11,4
Une	6	8,6
Total	70	100,0

V. Conclusion

- Sco chez l'enfant est une urgence médicochirurgicale
- les 1ers gestes en cas d'ingestion de produits caustiques sont largement dominés par les attitudes traditionnelles ancestrales
- Les victimes fréquentes plusieurs structures de soins avant d'arriver dans le service.