

Santé publique et pharmaciens

ReMeD
Jean Loup Rey
Madeleine Leloup



Table Ronde Pharmagora 2015

Trois niveaux

- ◆ à partir des activités quotidiennes dans officine (suivi des ventes)
- ◆ interventions de prévention et éducation pour la santé
- ◆ au niveau des pharmacies hospitalières (suivi des consos)


Suivi des ventes et SP

- ◆ les GROG (Groupes Régionaux d'observation de la Grippe)
- ◆ Envoi chaque jour par pharmaciens volontaires des chiffres de vente de fébrifuges et antalgiques




Suivi des ventes et SP

- ◆ GROG
 - ◆ Ventes des antidiarrhéiques et SRO
- => suivi de l'épidémie de gastro entérites



Suivi des ventes et SP



Vente anxiolytiques et attentats

SIDA (JPIP 2003)

- ◆ Atelier sur ce thème
- ◆ Bilan des discussions autour d'un questionnaire proposé aux participants :
 - Conseils après rupture condom : 11
 - Conseils après risques sexuels : 13
 - Autres conseils : 16
 - Dispenser ARV gratuitement sans frais : 13
 - Dispenser ARV gratuitement avec frais : 5
 - Intervenir pour aide à observance : 7

Éducation pour la santé

- ◆ Campagnes de prévention
 - (MST, nutrition, palu)
- ◆ Promotion des préservatifs
 - (distributeurs et autres moyens)
- ◆ Dépistage et suivi de la TA
- ◆ Dépistage et suivi du diabète
- ◆ Dépistage et suivi du surpoids


Prévention

- ◆ Pour le Collectif national des groupements de pharmaciens d'officine (CNGPO) , la prévention est au coeur du métier de pharmacien.
- ◆ Il a mené, en 2007, une expérimentation de dépistage primaire des dysfonctionnements rénaux chez les polymédiqués de plus de 65 ans,
- ◆ Avec la participation de 136 pharmacies de la région pays de la Loire.
- ◆ Sur 1 270 patients contrôlés, 148 ont été orientés vers le médecin.
- ◆ Signature d'un contrat avec l'assureur Allianz permettant au pharmacien de recevoir une rémunération après avoir dispensé et rédigé un conseil pharmaceutique.

Prévention

- ◆ Lutte contre tabac
- ◆ Lutte contre addictions

- ◆ Promotion des vaccinations
- ◆ Dépistage et suivi paludisme
- ◆ Prévention palu (MIILD, anti vecteurs)




Pharmaciens hospitaliers

- ◆ SIDA
- ◆ « découverte du sida » par pharmaciens
- ◆ c'est la mise en évidence d'une consommation « excessive » de pentamidine (médicaments trypanosomose et pneumocystose) qui a alerté le monde scientifique et médical.

Pharmaciens hospitaliers



◆ Épidémie de résistances

Augmentation de demande de Amikacine a alerté sur épidémie d'Acinetobacter résistant



Pharmaciens hospitaliers

- ◆ Épidémie de Guillain Barré après ZIKA en 2013-2014 (CH de Papeete).
- ◆ Une augmentation de la demande d'immunoglobulines, outre les problèmes d'appro, a montré l'épidémie de GB



Différents dosages d'immunoglobulines détenus au CHPF	5G	10G	20G
Consommation Mensuelle Moyenne (CMM) en nombre de flacons	16	52	139
Consommation Maximale Moyenne (CMaxM) en nombre de flacons	30	75	223
Délai de livraison = D (en mois)	0,5	0,5	0,5
Excédent = CMaxM-CMM = E en nombre de flacons	14	23	84
Stock de sécurité = SS = E/D = Seuil minimum	7	11,5	42
Point de commande = (CMM*D) +SS en nombre de flacons	18	37,5	111,5

Tableau 1: Méthode EXPERT pour la détermination du seuil minimum de commande en période d'épidémie

Avenir

- ◆ Suivi des thérapeutiques
- ◆ Rôle dans la « bonne observance » et « éducation thérapeutique » des patients
- ◆ Pharmacovigilance

Avenir

- ◆ Dépistage (avec counselling)
 - Diabète, HTA, surpoids
 - VIH, angine, palu (TDR)
 - infection urinaire (bandelettes)
- ◆ Et suivi,

Avenir, rôle en santé mère enfant

- ◆ Suivi des femmes enceintes (TA, urines, glycémie)
- ◆ Suivi des bébés (poids)

Avenir

- ◆ Vaccinations des adultes ?
- ◆ Contrôle acuité visuelle ??